

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

фахового вступного іспиту при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю Е1 Біологія та біохімія

Варіант			Перевірів								Бали			51	
3			- ДМБ-1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	

Перший рівень складності (завдання 1-32, макс. 3 бали)

- Встановлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели та їх спадковий матеріал не має нуклеосомної організації. Що це за організми?
 - ☐ A) Віруси
 - ☐ B) Аскоміцети
 - ☒ C) Еукаріоти
 - ☐ D) Найпростіші
 - ☐ E) Прокаріоти
- Елементарні екологічні системи, у яких здійснюється речовинно-енергетичний кругообіг, що обумовлений життєдіяльністю багатьох організмів, становлять рівень організації живої матерії, назва якого:
 - ☐ A) Біосферний
 - ☒ B) Екосистемний
 - ☐ C) Популяційний
 - ☐ D) Видовий
 - ☐ E) Організмівий
- Речовини виводяться з клітини в результаті з'єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:
 - ☐ A) Осмос
 - ☒ B) Ендоцитоз
 - ☐ C) Активний транспорт
 - ☐ D) Екзоцитиоз
 - ☐ E) Полегшена дифузія
- На електронній мікрофотографії клітини науковець виявив надмолекулярну структуру – глікозилні групи глікокаліксу, що мають вигляд коротких ланцюжків, щільно зв'язаних із мембранними білками та ліпідами. Яку функцію виконують ці структури?
 - ☐ A) Структурну
 - ☐ B) Транспортну
 - ☒ C) Бар'єрну
 - ☐ D) Рецепторну
 - ☐ E) Ферментативну

5. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та виділення рештків забезпечують органели:
- ☒ A) Лізосоми
 - ☐ B) Рибосоми
 - ☐ C) Мітохондрії
 - ☐ D) Клітинний центр
 - ☐ E) Комплекс Гольджі
6. При вивченні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані з плазмолемою. Вкажіть ці органели:
- ☐ A) Мітохондрії
 - ☐ B) Центросоми
 - ☐ C) Ендоплазматична сітка
 - ☐ D) Рибосоми
 - ☒ E) Комплекс Гольджі
7. Під час електронномікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, сплюснених у центральній частині й розширених на периферії, та дрібних міхурців із секреторними гранулами. Назвіть цю структуру:
- ☐ A) Лізосома
 - ☐ B) Комплекс Гольджі
 - ☐ C) Ендоплазматична сітка
 - ☐ D) Піноцитозні міхурці
 - ☒ E) Мікротрубочки
8. У хворого на хронічний гепатит в аналізі крові на білкові фракції виявили зниження загальної кількості білка. Це означає, що у клітинах печінки порушена функція таких органел:
- ☒ A) Лізосоми
 - ☐ B) Мітохондрії
 - ☐ C) Комплекс Гольджі
 - ☐ D) Гранулярна ендоплазматична сітка
 - ☐ E) Цитоскелет
9. Тривалий вплив на організм людини токсичних речовин призвів до руйнування органел, які відповідають за синтез білків у гепатоцитах печінки. Які органели здійснюють синтез білків у гепатоцитах?
- ☐ A) Пероксисоми
 - ☐ B) Мітохондрії
 - ☒ C) Лізосоми
 - ☐ D) Агранулярна ендоплазматична сітка
 - ☐ E) Рибосоми
10. Симбіотична теорія пояснює походження еукаріотичних клітин переходом до аеробного дихання. Це відбулося внаслідок проникнення в клітину аеробних бактерій, які в процесі еволюції перетворилися на:
- ☒ A) Комплекс Гольджі
 - ☐ B) Пероксисоми
 - ☐ C) Мітохондрії
 - ☐ D) Рибосоми
 - ☐ E) Лізосоми

11. У ядрі клітини є непостійні структури, які зникають на початку поділу клітини і знову з'являються наприкінці його. Вони містять білок, РНК і беруть участь у формуванні субодиниць рибосом. Які це структури?
- ☐ A) Мікротрубочки
 - ☐ B) Мікрофібрили
 - ☐ C) Ядерця
 - ☐ D) Полісоми
 - ☒ E) Нуклеосоми
12. У ядрі клітини є непостійні структури, які зникають на початку поділу клітини і знову з'являються наприкінці його. Вони містять білок, РНК і беруть участь у формуванні субодиниць рибосом. Які це структури?
- ☐ A) Мікротрубочки
 - ☐ B) Мікрофібрили
 - ☐ C) Полісоми
 - ☒ D) Ядерця
 - ☐ E) Нуклеосоми
13. Під час гістохімічного дослідження гепатоцита у цитоплазмі клітини виявлено пухирці діаметром 0,05-1,5 мкм заповнені ферментами перекисного окислення - каталазою, пероксидазою. Як називаються ці органели?
- ☐ A) Пероксисоми.
 - ☐ B) Лізосоми.
 - ☐ C) Меланосоми.
 - ☐ D) Ліпосоми.
 - ☒ E) Фагосоми.
14. У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апікальній частині з'являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули?
- ☒ A) Включення
 - ☐ B) Гранулярна ендоплазматична сітка
 - ☐ C) Екзоцитозні вакуолі
 - ☐ D) Лізосоми
 - ☐ E) Мікрофіламенти
15. У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апікальній частині з'являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули?
- ☐ A) Гранулярна ендоплазматична сітка
 - ☐ B) Екзоцитозні вакуолі
 - ☒ C) Включення
 - ☐ D) Лізосоми
 - ☐ E) Мікрофіламенти
16. На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?
- ☐ A) В анафазі.
 - ☐ B) В метафазі.
 - ☐ C) В телофазі.
 - ☒ D) В інтерфазі.
 - ☐ E) В профазі.

17. У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?
- ☐ A) Профаза
 - ☐ B) Інтерфаза
 - ☒ C) Метафаза
 - ☐ D) Анафаза
 - ☐ E) Телофаза
18. В клітині, яка мітотично ділиться спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина:
- ☐ A) Метафази
 - ☐ B) Анафази
 - ☐ C) Телофази
 - ☒ D) Профази
 - ☐ E) Інтерфази
19. У мітозі розрізняють чотири фази. В якій фазі клітина людини має 92 однохроматидні хромосоми?
- ☐ A) Телофаза
 - ☐ B) Метафаза
 - ☐ C) Профаза
 - ☒ D) Анафаза
 - ☐ E) Інтерфаза
20. Експериментально (дією мутагенних факторів) у клітині порушено формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?
- ☒ A) Біосинтез білка
 - ☐ B) Біологічне окиснення
 - ☐ C) Біосинтез вуглеводів
 - ☐ D) Синтез АТФ
 - ☐ E) Фотосинтез
21. Спадкова інформація зберігається у ДНК, але безпосередньої участі у синтезі білків у клітинах ДНК не бере. Який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації у поліпептидний ланцюг?
- ☒ A) Реплікація
 - ☐ B) Утворення і-РНК
 - ☐ C) Трансляція
 - ☐ D) Утворення р-РНК
 - ☐ E) Утворення т-РНК
22. Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид більшості тварин має певне і стале число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні організмів є :
- ☒ A) Мейоз
 - ☐ B) Шизогонія
 - ☐ C) Амітоз
 - ☐ D) Регенерація
 - ☐ E) Брунькування
23. У генетично здорових батьків народилася дитина хвора на фенілкетонурію (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?
- ☐ A) AA x AA
 - ☐ B) AA x Aa
 - ☐ C) Aa x aa
 - ☐ D) Aa x Aa
 - ☒ E) aa x aa

24. Чоловік є гомозиготою за домінантним геном, що зумовлює полідактилію, а дружина — гомозиготою за рецесивним алелем цього гена. Яка з наведених біологічних закономірностей проявиться в їхніх дітей щодо наявності в них полідактилії?
- ☐ A) Закон розчеплення.
 - ☐ B) Закон незалежного успадкування ознак.
 - ☒ C) Явище зчепленого успадкування генів.
 - ☐ D) Закон одноманітності гібридів I покоління.
 - ☐ E) Явище успадкування, зчепленого зі статтю.
25. Чоловік є гомозиготою за домінантним геном, що зумовлює полідактилію, а дружина — гомозиготою за рецесивним алелем цього гена. Яка з наведених біологічних закономірностей проявиться в їхніх дітей щодо наявності в них полідактилії?
- ☐ A) Закон розчеплення.
 - ☐ B) Закон незалежного успадкування ознак.
 - ☒ C) Явище зчепленого успадкування генів.
 - ☐ D) Явище успадкування, зчепленого зі статтю.
 - ☐ E) Закон одноманітності гібридів I покоління.
26. Зріст людини контролюють кілька неалельних домінантних генів. Встановлено, що при збільшенні кількості цих генів зріст збільшується. Який тип взаємодії між цими генами?
- ☐ A) Кодомінування
 - ☐ B) Епістаз
 - ☒ C) Комплементарність
 - ☐ D) Плейотропія
 - ☐ E) Полімерія
27. У чоловіка за системою AB0 встановлена IV (AB) група крові, а у жінки - III (B). У батька жінки I (0) група крові. В них народилося 5 дітей. Вкажіть генотип тієї дитини, яку можна вважати позашлюбною:
- ☒ A) I^0I^0
 - ☐ B) I^AI^B
 - ☒ C) I^BI^B
 - ☐ D) I^AI^0
 - ☐ E) I^BI^0
28. Кросинговер — це обмін ділянками гомологічних хромосом у процесі клітинного поділу, переважно в профазі першого мейотичного поділу, іноді в мітозі. Від чого залежить частота кросинговеру?
- ☐ A) Від зовнішніх факторів
 - ☒ B) Від кількості хромосом
 - ☐ C) Від відстані між генами
 - ☐ D) Від типу хромосоми
 - ☐ E) Від довжини хромосоми
29. Кросинговер — це обмін ділянками гомологічних хромосом у процесі клітинного поділу, переважно в профазі першого мейотичного поділу, іноді в мітозі. Від чого залежить частота кросинговеру?
- ☐ A) Від зовнішніх факторів
 - ☐ B) Від відстані між генами
 - ☒ C) Від кількості хромосом
 - ☐ D) Від типу хромосоми
 - ☐ E) Від довжини хромосоми

30. Кросинговер – це обмін ділянками гомологічних хромосом у процесі клітинного поділу, переважно в профазі першого мейотичного поділу, іноді в мітозі. Від чого залежить частота кросинговеру?
- ☐ A) Від зовнішніх факторів
 - ☐ B) Від відстані між генами
 - ☐ C) Від кількості хромосом
 - ☒ D) Від типу хромосоми
 - ☐ E) Від довжини хромосоми
31. Кросинговер – це обмін ділянками гомологічних хромосом у процесі клітинного поділу, переважно в профазі першого мейотичного поділу, іноді в мітозі. Від чого залежить частота кросинговеру?
- ☐ A) Від зовнішніх факторів
 - ☐ B) Від кількості хромосом
 - ☐ C) Від відстані між генами
 - ☒ D) Від типу хромосоми
 - ☐ E) Від довжини хромосоми
32. У молодого подружжя народилася дитина з незарощенням дужок хребців і твердого піднебіння. Як називаються вади розвитку, які нагадують відповідні органи предкових груп людини?
- ☐ A) Атавістичні
 - ☐ B) Нефілогенетичні
 - ☒ C) Генокопії
 - ☐ D) Фенокопії
 - ☐ E) Алогенні

Другий рівень складності (завдання 33-45, макс. 8 балів)

33. Кросинговер – це обмін ділянками гомологічних хромосом у процесі клітинного поділу, переважно в профазі першого мейотичного поділу, іноді в мітозі. Від чого залежить частота кросинговеру?
- ☐ A) Від зовнішніх факторів
 - ☐ B) Від кількості хромосом
 - ☒ C) Від типу хромосоми
 - ☐ D) Від довжини хромосоми
 - ☐ E) Від відстані між генами
34. Прокаріотичні та еукаріотичні клітини характеризуються здатністю до поділу. Поділ прокаріотичних клітин відрізняється від поділу еукаріотичних, але існує молекулярний процес, який лежить в основі цих поділів. Який це процес?
- ☐ A) Транскрипція
 - ☐ B) Репарація
 - ☐ C) Трансляція
 - ☒ D) Реплікація ДНК
 - ☐ E) Ампліфікація генів
35. У бактерій встановлений процес кон'югації, при якому між бактеріями утворюється цитоплазматичний місток, по якому з клітини-донора до клітини-реципієнта надходять плазмідні і фрагменти молекули ДНК. Яке значення цього процесу?
- ☒ A) Забезпечує обмін речовинами між клітинами
 - ☐ B) Ліквідує небажані мутації
 - ☐ C) Підвищує гетерозиготність
 - ☐ D) Сприяє активізації мутаційного процесу
 - ☐ E) Забезпечує обмін генетичного матеріалу

36. Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів мала і-РНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?
- ☐ A) 54
 - ☒ B) 27
 - ☐ C) 108
 - ☐ D) 162
 - ☐ E) 44
37. Встановлено, що не всі точкові мутації типу заміни пари основ спричиняють зміну амінокислоти у складі поліпептиду. Завдяки якій властивості генетичного коду це можливо?
- ☐ A) Колінеарності
 - ☐ B) Виродженості
 - ☒ C) Універсальності
 - ☐ D) Неперервності
 - ☐ E) Триплетності
38. Встановлено, що не всі точкові мутації типу заміни пари основ спричиняють зміну амінокислоти у складі поліпептиду. Завдяки якій властивості генетичного коду це можливо?
- ☐ A) Колінеарності
 - ☒ B) Універсальності
 - ☐ C) Неперервності
 - ☐ D) Виродженості
 - ☐ E) Триплетності
39. При секвенуванні ДНК і біохімічному аналізі поліпептиду було встановлено, що лінійна послідовність триплетів нуклеотидів відповідає послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюзі. Визначте, яка властивість генетичного коду була встановлена?
- ☐ A) Триплетність
 - ☐ B) Виродженість
 - ☐ C) Колінеарність
 - ☒ D) Неперекривність
 - ☐ E) Універсальність
40. Жодна азотиста основа одного кодону ДНК не входить до складу іншого кодону. Як називається дана властивість генетичного коду?
- ☒ A) Неперекривність
 - ☐ B) Триплетність
 - ☐ C) Специфічність
 - ☐ D) Універсальність
 - ☐ E) Колінеарність
41. Під час дослідження клітин було встановлено в їх цитоплазмі високий вміст ферменту аміноацил-тРНК-синтетаза. Він забезпечує в клітині такий процес:
- ☐ A) Репарація
 - ☐ B) Елонгація
 - ☐ C) Транскрипція
 - ☒ D) Реплікація
 - ☐ E) Активація амінокислот
42. У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування і-РНК щодо рибосоми. Амінокислоти з'єднуються пептидними зв'язками в певній послідовності - відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності:
- ☒ A) Нуклеотидів т-РНК
 - ☐ B) Антикодонів т-РНК
 - ☐ C) Кодонів і-РНК
 - ☐ D) Нуклеотидів р-РНК
 - ☐ E) Антикодонів р-РНК

43. Синтез і-РНК проходить на матриці ДНК з урахуванням принципу комплементарності. Якщо триплети у ДНК наступні – АТГ-ЦГТ, то відповідні кодони і-РНК будуть:
- ☒ А) АУГ-ЦГУ
 - ☐ В) УАЦ-ГЦА
 - ☐ С) АТГ-ЦГТ
 - ☐ D) УАГ-ЦГУ
 - ☐ Е) ТАГ-УГУ
44. При цитологічних дослідженнях було виявлено велику кількість різних молекул т-РНК, які доставляють амінокислоти до рибосоми. Чому буде дорівнювати кількість різних типів т-РНК у клітині?
- ☐ А) Кількості нуклеотидів
 - ☒ В) Кількості амінокислот
 - ☐ С) Кількості білків, синтезованих у клітині
 - ☐ D) Кількості триплетів, що кодують амінокислоти
 - ☐ Е) Кількості різних типів і-РНК
45. Які органічні сполуки виконують роль посередників між молекулами ДНК, як носіями генетичної інформації, та поліпептидними ланцюгами, як елементарними ознаками?
- ☐ А) Вуглеводи
 - ☐ В) Ліпіди
 - ☐ С) РНК
 - ☐ D) Білки
 - ☒ Е) АТФ

